

Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wer?	
<p>Hände/Haut Desinfektion</p>	Hygienische Händedesinfektion	Aseptoman viral gebrauchsfertig – 1 Minute satte Benetzung	Desinfektionsmittel aus Direktspender in die trockenen Hände geben. Gründlich über die Hände (inkl. Handgelenke) verteilen und einreiben. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalze zu beachten.	Nach Kontakt mit erkrankten Kindern. Nach Kontakt mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem. Nach Kontakt mit kontaminierten Gegenständen und Flächen. Mehrere Male täglich. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	Handreinigung	WiBUplus milde Waschlotion WiBUplus Waschlotion sensitiv WiBUplus Cremeseife mild WiBUplus Schaumseife sensitiv	Waschlotion/Seife auf die feuchten Hände geben und aufschäumen. Mit lauwarmem Wasser gründlich abspülen und Hände gut mit weichen Einmal-Handtüchern abtrocknen.	Vor der Arbeit. Bei Verschmutzung. Nach der Arbeit. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
<p>Hände/Haut Pflege</p>	Hautschutz	WiBUplus Handschutzcreme WiBUplus Handschutzcreme sensitiv	Creme auf saubere, trockene Hände auftragen und gründlich einmassieren.	Bei Arbeitsbeginn. Vor längerem Tragen von Handschuhen. Nach dem Händewaschen.	Alle Mitarbeiter
	Hautpflege	WiBUplus Handpflegecreme WiBUplus Handpflegecreme sensitiv	Hautpflegeprodukt auftragen und gründlich in die saubere, trockene Haut einmassieren.	Nach Pausen. Nach der Arbeit.	Alle Mitarbeiter
<p>Fläche/ Inventar</p>	Spender für • Desinfektionsmittel • Waschlotion • Einmal-Handtücher • Pflegecreme	ULTRASOL® active 3 % – 60 Min. 3 Beutel à 20 g – 2 Liter 4 Beutel à 20 g – 2,5 Liter	System desinfizierend aufbereiten (Pumpmechanismus). Auslauf überprüfen und desinfizieren.	Mind. 1 x monatlich sowie vor Ersetzen der Flasche Spendersystem reinigen. Wöchentlich.	Alle Mitarbeiter
	Fieberthermometer	ULTRASOL® active 3 % – 60 Min. 3 Beutel à 20 g – 2 Liter 4 Beutel à 20 g – 2,5 Liter	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufdrehen lassen. Vor Wiederbenutzung mit Trinkwasser abspülen.	Direkt nach Gebrauch.	Alle Mitarbeiter
	Spielzeug, Spielgeräte	ULTRASOL® active 3 % – 60 Min. 3 Beutel à 20 g – 2 Liter 4 Beutel à 20 g – 2,5 Liter	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufdrehen lassen. Vor Wiederbenutzung mit Trinkwasser abspülen.	Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	Alle Mitarbeiter
	Wickeltischauflage	ULTRASOL® active 3 % – 60 Min. 3 Beutel à 20 g – 2 Liter 4 Beutel à 20 g – 2,5 Liter	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufdrehen lassen. Vor Wiederbenutzung mit Trinkwasser abspülen.	Täglich. Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	Alle Mitarbeiter
	Alle Kontaktflächen (z. B. Türgriffe, Arbeitsflächen, Wickeltisch)	ULTRASOL® active 3 % – 60 Min. 3 Beutel à 20 g – 2 Liter 4 Beutel à 20 g – 2,5 Liter	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufdrehen lassen. Vor Wiederbenutzung mit Trinkwasser abspülen.	Täglich. Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	Alle Mitarbeiter
	Fußböden	ULTRASOL® active 3 % – 60 Min. 3 Beutel à 20 g – 2 Liter 4 Beutel à 20 g – 2,5 Liter	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufdrehen lassen.	Täglich. Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	Alle Mitarbeiter
	Sanitäre Einrichtungen (z. B. Toilette, Waschbecken, Windeleimer, Abfalleimer)	ULTRASOL® active 3 % – 60 Min. 3 Beutel à 20 g – 2 Liter 4 Beutel à 20 g – 2,5 Liter	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufdrehen lassen.	Täglich. Nach jeder Toilettennutzung durch ein erkranktes Kind. Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	Alle Mitarbeiter
	Geschirr und Besteck	WiBUplus Geschirrspülpulver WiBUplus Geschirrspül Tabs	Für Transport geschlossenes Behältnis nutzen. Maschinelle Aufbereitung bei mindestens 60 °C.	Nach Benutzung.	Alle Mitarbeiter
<p>Schutzkleidung/ Utensilien</p>	Wäsche	WiBUplus Desinfektionswaschmittel	Desinfizierendes Waschverfahren.	Nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material (z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem).	Alle Mitarbeiter
	Schutzkleidung	Chemikaliendichte Schutzhandschuhe		Beim Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.	Alle Mitarbeiter
		Einmal-Handschuhe	Nach Gebrauch entsorgen.	Beim Umgang mit Stuhl und Blut. Bei Bedarf.	
	Mund-Nasen-Schutz/ FFP2 Maske bei möglichem Kontakt mit virushaltigen Tröpfchen	Nach Gebrauch entsorgen.	Bei der vorhersehbaren Entstehung von Aerosolen. Zum Eigenschutz.		

Bereits der Verdacht auf eine Erkrankung durch Noro-Viren ist meldepflichtig gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Infektionsschutzgesetz.
Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflicht gem. § 34 Infektionsschutzgesetz.

Bitte informieren Sie die Eltern aller Kinder über die aufgetretene Durchfallerkrankung. Bis zur Abholung durch die Eltern sollte das erkrankte Kind möglichst getrennt von den übrigen Kindern betreut werden. Betreuer von erkrankten Kindern sollten nicht in die Essenszubereitung und -verteilung eingebunden werden. Kein Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen durch Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und an infektiöser Gastroenteritis erkrankt sind.

ACHTUNG! Beachten Sie immer die Konzentration und Einwirkzeit von Desinfektionsmitteln! Setzen Sie Desinfektionsmittel immer mit kaltem Wasser an! Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, wenn Sie mit Desinfektionsmitteln umgehen, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper gedacht sind! Tragen Sie immer Einmal-Handschuhe, wenn Sie mit Blut, Fäkalien und Auswurf umgehen! RKI-Empfehlungen müssen berücksichtigt werden! Ggf. Rücksprache mit dem Gesundheitsamt! Dieser Desinfektionsplan ist auf Basis der Technischen Regel für Biologische Arbeitsstoffe „TRBA 250“ erstellt. Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.
© WiBU PflegePlus GmbH, Gerstenstieg 6, 22926 Ahrensburg · Art.-Nr. 804166 · 07/2019

Tel. +49 4102 483-8280 · pflege@wibu-gruppe.de · www.wibu-gruppe.de

Datum/freigegeben

MIT DER
PFLEGE
IM REINEN



Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wer?
<p>Hände/Haut Desinfektion</p>	Hygienische Händedesinfektion	Desinfektionsmittel aus Direktspender in die trockenen Hände geben. Gründlich über die Hände (inkl. Handgelenke) verteilen und einreiben. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalze zu beachten.	Nach Kontakt mit erkrankten Kindern. Nach Kontakt mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem. Nach Kontakt mit kontaminierten Gegenständen und Flächen. Mehrmals täglich. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	Handreinigung	Waschlotion/Seife auf die feuchten Hände geben und aufschäumen. Mit lauwarmem Wasser gründlich abspülen und Hände gut mit weichen Einmal-Handtüchern abtrocknen.	Vor der Arbeit. Bei Verschmutzung. Nach der Arbeit. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
<p>Hände/Haut Pflege</p>	Hautschutz	Creme auf saubere, trockene Hände auftragen und gründlich einmassieren.	Bei Arbeitsbeginn. Vor längerem Tragen von Handschuhen. Nach dem Händewaschen.	Alle Mitarbeiter
	Hautpflege	Hautpflegeprodukt auftragen und gründlich in die saubere, trockene Haut einmassieren.	Nach Pausen. Nach der Arbeit.	Alle Mitarbeiter
<p>Fläche/ Inventar</p>	Spender für • Desinfektionsmittel • Waschlotion • Einmal-Handtücher • Pflegecreme	System desinfizierend aufbereiten (Pumpmechanismus).	Mind. 1 x monatlich sowie vor Ersetzen der Flasche Spendersystem reinigen.	Alle Mitarbeiter
		Auslauf überprüfen und desinfizieren.	Wöchentlich.	Alle Mitarbeiter
	Fieberthermometer	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufdrehen lassen. Vor Wiederbenutzung mit Trinkwasser abspülen.	Direkt nach Gebrauch.	Alle Mitarbeiter
	Spielzeug, Spielgeräte	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufdrehen lassen. Vor Wiederbenutzung mit Trinkwasser abspülen.	Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	Alle Mitarbeiter
	Wickeltischauflage	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufdrehen lassen. Vor Wiederbenutzung mit Trinkwasser abspülen.	Täglich. Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	Alle Mitarbeiter
	Alle Kontaktflächen (z. B. Türgriffe, Arbeitsflächen, Wickeltisch)	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufdrehen lassen. Vor Wiederbenutzung mit Trinkwasser abspülen.	Täglich. Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	Alle Mitarbeiter
	Fußböden	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufdrehen lassen.	Täglich. Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	Alle Mitarbeiter
	Sanitäre Einrichtungen (z. B. Toilette, Waschbecken, Windeleimer, Abfalleimer)	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufdrehen lassen.	Täglich. Nach jeder Toilettennutzung durch ein erkranktes Kind. Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	Alle Mitarbeiter
Geschirr und Besteck	Für Transport geschlossenes Behältnis nutzen. Maschinelle Aufbereitung bei mindestens 60 °C.	Nach Benutzung.	Alle Mitarbeiter	
<p>Schutzkleidung/ Utensilien</p>	Wäsche	Desinfizierendes Waschverfahren.	Nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material (z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem).	Alle Mitarbeiter
	Schutzkleidung	Nach Gebrauch entsorgen.	Beim Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.	Alle Mitarbeiter
		Nach Gebrauch entsorgen.	Beim Umgang mit Stuhl und Blut. Bei Bedarf. Bei der vorhersehbaren Entstehung von Aerosolen. Zum Eigenschutz.	Alle Mitarbeiter

Bereits der Verdacht auf eine Erkrankung durch Noro-Viren ist meldepflichtig gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Infektionsschutzgesetz.
Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflicht gem. § 34 Infektionsschutzgesetz.

Bitte informieren Sie die Eltern aller Kinder über die aufgetretene Durchfallerkrankung. Bis zur Abholung durch die Eltern sollte das erkrankte Kind möglichst getrennt von den übrigen Kindern betreut werden. Betreuer von erkrankten Kindern sollten nicht in die Essenszubereitung und -verteilung eingebunden werden. Kein Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen durch Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und an infektiöser Gastroenteritis erkrankt sind.

ACHTUNG! Beachten Sie immer die Konzentration und Einwirkzeit von Desinfektionsmitteln! Setzen Sie Desinfektionsmittel immer mit kaltem Wasser an! Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, wenn Sie mit Desinfektionsmitteln umgehen, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper gedacht sind! Tragen Sie immer Einmal-Handschuhe, wenn Sie mit Blut, Fäkalien und Auswurf umgehen! RKI-Empfehlungen müssen berücksichtigt werden! Ggf. Rücksprache mit dem Gesundheitsamt! Dieser Desinfektionsplan ist auf Basis der Technischen Regel für Biologische Arbeitsstoffe „TRBA 250“ erstellt. Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.
© WiBU PflegePlus GmbH, Gerstenstieg 6, 22926 Ahrensburg · Art.-Nr. 804166 · 07/2019

Tel. +49 4102 483-8280 · pflege@wibu-gruppe.de · www.wibu-gruppe.de

Datum/freigegeben

