

Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wer?	
Hinweis Einzelunterbringung während der akuten Krankheitsphase (Durchfall). Zimmer mit eigener Toilette für betroffene Bewohner. Kohortenisolierung ist möglich.					
 Hände/Haut Desinfektion	Hygienische Händedesinfektion	WiBUplus Händedesinfektion konz. 30 Sek. – satte Benetzung WiBUplus Händedesinfektionsgel konz. 30 Sek. – satte Benetzung WiBUplus Händedesinfektion sensitiv konz. 30 Sek. – satte Benetzung	Desinfektionsmittel aus Direktspender in die trockenen Hände geben. Gründlich über die Hände (inkl. Handgelenke) verteilen und einreiben. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalze zu beachten. Nach der Desinfektion sind die Hände zur mechanischen Beseitigung bakterieller Sporen zu waschen.	Vor Eintritt in das Zimmer. Vor dem Verlassen des Zimmers. Vor und nach Bewohnerkontakt. Nach Kontakt mit (potentiell) kontaminiertem Material. Nach Ablegen der Handschuhe.	Alle Mitarbeiter
	Instrumenten-desinfektion (z. B. Nagelscheren, Pinzetten)	Alternativ: Einwegmaterialien. oder: Korsorex basic 3% – 60 Min.	Herstellerinformationen beachten. Instrumente in eine Instrumentenwanne (mit Siebeinsatz und Deckel) mit Desinfektionsmittellösung legen und vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen, unter fließendem Wasser abspülen und trocknen.	Nach Gebrauch sicher verwerfen. Sofort nach Gebrauch.	Pflegepersonal
 Fläche/ Inventar	Bewohnernahe Kontaktflächen wie: Tisch, Nachttisch, Griffe, Türklinken, Bettgestell	Optisept® 2% – 30 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Täglich. Nach Kontamination sofort.	Pflegepersonal Reinigungskräfte
	Matratzenschutzbezug	Optisept® 2% – 30 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Nach hausüblichem Rhythmus. Nach Kontamination sofort.	Pflegepersonal Reinigungskräfte
	Fußboden	Optisept® 2% – 30 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Täglich. Nach Kontamination sofort.	Pflegepersonal Reinigungskräfte
	Benutzte Geräte und Hilfsmittel wie: Blutdruck-, Blutzucker-messgeräte, Fieberthermometer	Optisept® 2% – 30 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Nach dem Einsatz sowie ggf. vor dem Entfernen aus dem Zimmer.	Pflegepersonal
	Sanitärbereich	Optisept® 2% – 30 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Täglich. Nach Kontamination sofort.	Pflegepersonal Reinigungskräfte
	Geschirr		Transport in geschlossenen Behältern. Geschirr routinemäßig reinigen (bevorzugt maschinell bei $\geq 60^\circ\text{C}$).	Nach Benutzung.	Alle Mitarbeiter
	Abfälle		In geschlossenen Behältern im Bewohnerzimmer sammeln. Täglich entsorgen.	Täglich.	Pflegepersonal Reinigungskräfte
 Schutz- kleidung/ Utensilien	Schutzkleidung	Schutzkleidung allgemein	Schutzkleidung bei Betreten des Zimmers anlegen und vor Verlassen des Zimmers ablegen und entsorgen.	Nach Gebrauch abwerfen.	Alle Mitarbeiter
		Einmal-Schutzkittel		Bei engem Bewohner-/Patientenkontakt (z. B. beim Betten)	
		Flüssigkeitsdichte Einwegschürzen		Bei Tätigkeiten, wo es zum Durchfeuchten der Kleidung kommen kann.	
		Mund-Nasen-Schutz		Bei der vorhersehbaren Entstehung von Aerosolen. Zum Eigenschutz.	
	Einmal-Handschuhe	Bei der Grund- und Behandlungspflege. Vor Kontakt mit kontaminierten Materialien oder Gegenständen. Bei Kontakt mit Körperausscheidungen.			
Kontaminierte Wäsche	Desinfizierendes Waschverfahren mit WiBUplus Desinfektionswaschmittel	Wäsche im flüssigkeitsbeständigen Wäschesack sammeln und der Aufbereitung zuführen. Als Infektionswäsche kennzeichnen.	Sofort.	Pflegepersonal	
Bett- und Leibwäsche Oberbekleidung	Entsprechend den Angaben im Hygieneplan				



Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wer?
Hinweis Einzelunterbringung während der akuten Krankheitsphase (Durchfall). Zimmer mit eigener Toilette für betroffene Bewohner. Kohortenisolierung ist möglich.				
 Hände/Haut Desinfektion	Hygienische Händedesinfektion	Desinfektionsmittel aus Direktspender in die trockenen Hände geben. Gründlich über die Hände (inkl. Handgelenke) verteilen und einreiben. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalze zu beachten. Nach der Desinfektion sind die Hände zur mechanischen Beseitigung bakterieller Sporen zu waschen.	Vor Eintritt in das Zimmer. Vor dem Verlassen des Zimmers. Vor und nach Bewohnerkontakt. Nach Kontakt mit (potentiell) kontaminiertem Material. Nach Ablegen der Handschuhe.	Alle Mitarbeiter
	Instrumenten-desinfektion (z. B. Nagelscheren, Pinzetten)	Herstellerinformationen beachten. Instrumente in eine Instrumentenwanne (mit Siebeinsatz und Deckel) mit Desinfektionsmittellösung legen und vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen, unter fließendem Wasser abspülen und trocknen.	Nach Gebrauch sicher verwerfen. Sofort nach Gebrauch.	Pflegepersonal
 Fläche/ Inventar	Bewohnernahe Kontaktflächen wie: Tisch, Nachttisch, Griffe, Türklinken, Bettgestell	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Täglich. Nach Kontamination sofort.	Pflegepersonal Reinigungskräfte
	Matratzenschutzbezug	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Nach hausüblichem Rhythmus. Nach Kontamination sofort.	Pflegepersonal Reinigungskräfte
	Fußboden	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Täglich. Nach Kontamination sofort.	Pflegepersonal Reinigungskräfte
	Benutzte Geräte und Hilfsmittel wie: Blutdruck-, Blutzucker-messgeräte, Fieberthermometer	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Nach dem Einsatz sowie ggf. vor dem Entfernen aus dem Zimmer.	Pflegepersonal
	Sanitärbereich	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Täglich. Nach Kontamination sofort.	Pflegepersonal Reinigungskräfte
	Geschirr	Transport in geschlossenen Behältern. Geschirr routinemäßig reinigen (bevorzugt maschinell bei $\geq 60^\circ\text{C}$).	Nach Benutzung.	Alle Mitarbeiter
	Abfälle	In geschlossenen Behältern im Bewohnerzimmer sammeln. Täglich entsorgen.	Täglich.	Pflegepersonal Reinigungskräfte
 Schutz- kleidung/ Utensilien	Schutzkleidung	Schutzkleidung bei Betreten des Zimmers anlegen und vor Verlassen des Zimmers ablegen und entsorgen.	Nach Gebrauch abwerfen. Bei engem Bewohner-/Patientenkontakt (z. B. beim Betten) Bei Tätigkeiten, wo es zum Durchfeuchten der Kleidung kommen kann. Bei der vorhersehbaren Entstehung von Aerosolen. Zum Eigenschutz. Bei der Grund- und Behandlungspflege. Vor Kontakt mit kontaminierten Materialien oder Gegenständen. Bei Kontakt mit Körperausscheidungen.	Alle Mitarbeiter
	Kontaminierte Wäsche	Wäsche im flüssigkeitsbeständigen Wäschesack sammeln und der Aufbereitung zuführen. Als Infektionswäsche kennzeichnen.	Sofort.	Pflegepersonal
	Bett- und Leibwäsche Oberbekleidung			

